

Exercice 1 :

Soit $f: I \rightarrow J$ définie par $f(x) = x^2$

1. Donner des ensembles I et J tels que f soit injective mais pas surjective.
2. Donner des ensembles I et J tels que f soit surjective mais pas injective.
3. Donner des ensembles I et J tels que f soit ni injective ni surjective.
4. Donner des ensembles I et J tels que f soit injective et surjective.

Allez à : [Correction exercice 1](#) :

Exercice 2 :

Dire (en justifiant) pour chacune des applications suivantes si elles sont injectives, surjectives, bijectives :

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto x^2$	$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ $x \mapsto x^2$	$f: [0,1] \rightarrow [0,2]$ $x \mapsto x^2$
$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto x + x^3$	$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto x^2 + x^3$	$k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto x + x^4$

Allez à : [Correction exercice 2](#) :

Exercice 3 :

Soit $I \subset \mathbb{R}$ et $J \subset \mathbb{R}$, deux intervalles de \mathbb{R} . Soit $f: I \rightarrow J$ une fonction strictement croissante.

1. Montrer que f est injective.

On pourra montrer la contraposée (et on rappelle que $x_1 \neq x_2$ équivaut à $x_1 < x_2$ ou $x_2 < x_1$)

2. Déterminer l'ensemble K tel que $f: I \rightarrow K$ soit bijective.

Allez à : [Correction exercice 3](#) :

Exercice 4 :

Soit $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ définie pour tout $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ par $f(n, m) = mn$

Soit $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $g(n) = (n, (n + 1)^2)$

1. f est-elle injective ?
2. f est-elle surjective ?
3. g est-elle injective ?
4. g est-elle surjective ?

Allez à : [Correction exercice 4](#) :

Exercice 5 :

Soient

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ $n \mapsto 2n$	$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ $n \mapsto E\left(\frac{n}{2}\right)$
--	---

Où $E(x)$ désigne la partie entière de x

Les fonctions sont-elles injectives, surjective ? Comparer $f \circ g$ et $g \circ f$.

Allez à : [Correction exercice 5](#) :

Exercice 6 :

Soit f une application de E vers E telle que :

$$f(f(E)) = E$$

Montrer que f est surjective.

Allez à : [Correction exercice 6](#) :

Exercice 7 :

On considère l'application $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $f(n) = n^2$

1. Existe-t-il $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $f \circ g = Id_{\mathbb{N}}$?
2. Existe-t-il $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $h \circ f = Id_{\mathbb{N}}$?

Allez à : [Correction exercice 7](#)

:

Exercice 8 :

Soit $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ définie par $f(n) = 2n$

1. Existe-t-il une fonction $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ telle que $f \circ g = Id_{\mathbb{Z}}$?
2. Existe-t-il une fonction $h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ telle que $h \circ f = Id_{\mathbb{Z}}$?

Allez à : [Correction exercice 8](#) :

Exercice 9 :

Soit $f: E \rightarrow F$ une application, où $Card(E) = Card(F)$

Montrer que les trois propriétés suivantes sont équivalentes

- (i) f est injective
- (ii) f est surjective
- (iii) f est bijective

Allez à : [Correction exercice 9](#) :

Exercice 10 :

Répondre aux questions qui suivent, en justifiant, le cas échéant, votre réponse par un bref argument, un calcul ou un contre-exemple.

1. Si les applications $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ et $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ sont bijectives, alors l'application $u \circ v \circ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ est aussi bijective. Vrai ou Faux, justifier.
2. L'application $f: \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}: (a, b, c) \mapsto 2^a 3^b 5^c$ est une application
(i) bijective (ii) injective et pas surjective (iii) surjective et pas injective (iv) ni surjective ni injective

Justifier.

3. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$. L'application $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ qui à l'entier $l \in \mathbb{Z}$ associe le reste de la division euclidienne de l par n est une application.
(i) bijective (ii) injective et pas surjective (iii) surjective et pas injective (iv) ni surjective ni injective

Justifier.

4. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tels que $ad - bc = 1$. Déterminer l'application réciproque de la bijection

$$f: \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^2$$

$$(u, v) \mapsto (au + bv + 1, cu + dv - 1)$$

Allez à : [Correction exercice 10](#) :

Exercice 11 :

1. Soient $q_1 \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$ et $q_2 \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$

Montrer que :

$$-\frac{1}{2} < \frac{1}{q_1} - \frac{1}{q_2} < \frac{1}{2}$$

2. Soit $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \setminus \{0,1\} \rightarrow \mathbb{Q}$ l'application définie par :

$$f(p, q) = p + \frac{1}{q}$$

- a. Montrer que f est injective ?
- b. f est-elle surjective ?

Allez à : Correction exercice 11 :

Exercice 12 :

Pour un entier $n \in \mathbb{N}$ on désigne par I_n l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$.

1. On suppose $n \geq 2$. Combien y-a-t-il d'application injectives $f: I_2 \rightarrow I_n$?
2. A quelle condition portant sur les entiers m et n peut-on définir une application $f: I_m \rightarrow I_n$ qui soit injective, surjective, bijective ?

Allez à : Correction exercice 12 :

Exercice 13 :

Soient E, F et G trois ensemble et soient $f: E \rightarrow F$ et $g: F \rightarrow G$ deux applications.

1. Montrer que si f et g sont injectives alors $g \circ f$ est injective.
2. Montrer que si f et g sont surjectives alors $g \circ f$ est surjective.
3. Que peut-on conclure sur $g \circ f$ si f et g sont bijectives ?
4. Montrer que si $g \circ f$ est injective alors f est injective.
5. Montrer que si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective.
6. Si à présent $f: E \rightarrow F$ et $g: F \rightarrow E$, déduire de ce qui précède ce que l'on peut dire dans les cas suivants :
 - a. $g \circ f = Id_E$
 - b. $f \circ g = Id_F$
 - c. $f \circ f = Id_E$

Allez à : Correction exercice 13 :

Exercice 14 :

Soient X et Y deux ensembles non vides et f une application de X dans Y . Une application s , de Y dans X , telle que $f \circ s = Id_Y$ s'appelle une section de f .

1. Montrer que si f admet au moins une section alors f est surjective.
2. Montrer que toute section de f est injective.

Une application r , de Y dans X , telle que $r \circ f = Id_X$ s'appelle une rétraction de f .

3. Montrer que si f possède une rétraction alors f est injective.
4. Montrer que si f est injective alors f possède une rétraction.
5. Montrer que toute rétraction de f est surjective.
6. En déduire que si f possède à la fois une section s et une rétraction r , alors f est bijective et l'on a : $r = s (= f^{-1}$ par conséquent).

Allez à : Correction exercice 14 :

Exercice 15 :

1. Soit f l'application de l'ensemble $\{1, 2, 3, 4\}$ dans lui-même définie par :

$$f(1) = 4, \quad f(2) = 1, \quad f(3) = 2, \quad f(4) = 2.$$

Déterminer $f^{-1}(A)$ lorsque $A = \{2\}$, $A = \{1, 2\}$, $A = \{3\}$.

2. Soit f l'application de \mathbb{R} dans \mathbb{R} définie par $f(x) = x^2$. Déterminer $f^{-1}(A)$ lorsque $A = \{1\}$, $A = [1, 2]$.

Allez à : Correction exercice 15 :

Exercice 16 :

1. Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x$. Déterminer $f([0, 1] \times [0, 1])$, $f^{-1}([-1, 1])$.

2. Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow [-1,1]$ définie par $f(x) = \cos(\pi x)$, déterminer $f(\mathbb{N})$, $f(2\mathbb{N})$, $f^{-1}(\{\pm 1\})$.
 Allez à : Correction exercice 16 :

Exercice 17 :

Soit $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, -y \leq x \leq y\}$

Soit $f: D \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = (x^2 + y^2, 2xy)$

1. Représenter D dans le plan.
2. a. Montrer que si deux couples de réels (x_1, y_1) et (x_2, y_2) vérifient

$$\begin{cases} x_1 + y_1 = x_2 + y_2 \\ x_1 - y_1 = x_2 - y_2 \end{cases}$$

Alors $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$ (autrement dit $x_1 = x_2$ et $y_1 = y_2$).

- b. Montrer que f est injective, on pourra se ramener au système du 2.a..
3. Est-ce que f est surjective ?

Allez à : Correction exercice 17 :

CORRECTIONS

Correction exercice 1 :

1. $I = [0,1]$ et $J = [-1,1]$.
2. $I = [-1,1]$ et $J = [0,1]$.
3. $I = [-1,1]$ et $J = [-1,1]$.
4. $I = [0,1]$ et $J = [0,1]$.

Allez à : Exercice 1 :

Correction exercice 2 :

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^2 \end{aligned}$$

$f(-1) = f(1)$ donc f n'est pas injective.

-4 n'a pas d'antécédent, car $f(x) = -4 \Leftrightarrow x^2 = -4$ n'a pas de solution dans \mathbb{R} . f n'est pas surjective.

Une fonction est bijective si et seulement si elle est injective et surjective donc cette fonction n'est pas bijective.

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^+ &\rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x &\mapsto x^2 \end{aligned}$$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1^2 = x_2^2 \Rightarrow \sqrt{x_1^2} = \sqrt{x_2^2} \Rightarrow |x_1| = |x_2| \Rightarrow x_1 = x_2$$

Car $x_1 \geq 0$ et $x_2 \geq 0$. f est injective.

Pour tout $y \in \mathbb{R}^*$, (celui de l'ensemble d'arrivée), il existe $x = \sqrt{y} \in \mathbb{R}^*$, (celui de l'ensemble de départ)

tel que : $y = f(x)$, en effet $f(x) = (\sqrt{y})^2 = y$ donc f est surjective.

f est bijective.

$$\begin{aligned} f: [0,1] &\rightarrow [0,2] \\ x &\mapsto x^2 \end{aligned}$$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1^2 = x_2^2 \Rightarrow \sqrt{x_1^2} = \sqrt{x_2^2} \Rightarrow |x_1| = |x_2| \Rightarrow x_1 = x_2$$

Car $x_1 \geq 0$ et $x_2 \geq 0$. f est injective.

2 n'a pas d'antécédent, car $f(x) = 2 \Leftrightarrow x^2 = 2$ n'a pas de solution dans $[0,1]$. f n'est pas surjective.

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x + x^3$$

g est une fonction dérivable, $g'(x) = 1 + 3x^2 > 0$ donc g est strictement croissante sur \mathbb{R} .

La contraposée de $g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ est $x_1 \neq x_2 \Rightarrow g(x_1) \neq g(x_2)$

Supposons que $x_1 \neq x_2$, alors $x_1 < x_2$ (ou $x_2 < x_1$, ce que revient au même), on en déduit que $g(x_1) < g(x_2)$ car g est strictement croissante, par conséquent $g(x_1) \neq g(x_2)$, g est injective.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

g est une bijection strictement croissante de \mathbb{R} sur \mathbb{R} , par conséquent pour tout $y \in \mathbb{R}$, il existe un unique $x \in \mathbb{R}$ tel que $y = g(x)$, g est surjective. Mais l'unicité du « x » fait que g est bijective donc il était inutile de montrer l'injectivité de g .

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2 + x^3$$

On va étudier (sommairement) cette fonction et dresser son tableau de variation.

h est une fonction dérivable sur \mathbb{R} . $h'(x) = 2x + 3x^2 = x(2 + 3x)$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$$

Le « x^3 » l'emporte sur le « x^2 ».

$$h(0) = 0 \quad \text{et} \quad h\left(-\frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{4}{9} - \frac{8}{27} = \frac{4}{27}$$

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	0	$+\infty$			
$h'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$h(x)$	$-\infty$	\nearrow	$\frac{4}{27}$	\searrow	0	\nearrow	$+\infty$

Les seules bijections de $E \subset \mathbb{R}$ sur $F \subset \mathbb{R}$ sont les fonctions strictement monotones dont l'image de E est F .

h n'est pas une bijection.

Comme $h(-1) = 0 = h(0)$, h n'est pas injective.

Pour tout $y \in \mathbb{R}$ il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $y = h(x)$, et bien il n'y a pas unicité sinon h serait bijective.

Pour tout $y \in [0, \frac{4}{27}[$ il existe trois valeurs x tel que $y = h(x)$, pour $y = \frac{4}{27}$, il y en a deux pour les autres y n'a qu'un antécédent.

$$k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x + x^4$$

On va étudier cette fonction, k est dérivable et $k'(x) = 1 + 4x^3$

$$k'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 + 4x^3 = 0 \Leftrightarrow x^3 = -\frac{1}{4} \Leftrightarrow x = \left(-\frac{1}{2^2}\right)^{\frac{1}{3}} = -\frac{1}{2^{\frac{2}{3}}}$$

$$k\left(-\frac{1}{2^{\frac{2}{3}}}\right) = \left(-\frac{1}{2^{\frac{2}{3}}}\right) \left(1 + \left(-\frac{1}{2^{\frac{2}{3}}}\right)^3\right) = \left(-\frac{1}{2^{\frac{2}{3}}}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \left(-\frac{1}{2^{\frac{2}{3}}}\right) \times \frac{3}{4} = -\frac{3}{8^{\frac{2}{3}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$$

Le « x^4 » l'emporte sur le « x ».

x	$-\infty$	$-\frac{3}{8^{\frac{2}{3}}}$	$+\infty$		
$k'(x)$		$-$	0	$+$	
$k(x)$	$+\infty$	\searrow	$-\frac{3}{8^{\frac{2}{3}}}$	\nearrow	$+\infty$

Pour tout $y > -\frac{3}{8^{\frac{2}{3}}}$, y admet deux antécédents, k est ni surjective ni injective.

Allez à : Exercice 2 :

Correction exercice 3 :

1.

Si $x_1 < x_2$ alors $f(x_1) < f(x_2)$ donc $f(x_1) \neq f(x_2)$

Si $x_1 > x_2$ alors $f(x_1) > f(x_2)$ donc $f(x_1) \neq f(x_2)$

Donc f est injective.

2. $K = f(I)$

Allez à : Exercice 3 :

Correction exercice 4 :

1.

$$f(1,2) = 1 \times 2 = 2 \times 1 = f(2,1)$$

Donc f n'est pas injective.

2. $f(1, p) = 1 \times p = p$

Donc pour tout $p \in \mathbb{N}$, il existe $(n, m) = (1, p)$ tel que $p = f(n, m)$

f est surjective.

3.

$$g(n_1) = g(n_2) \Rightarrow (n_1, (n_1 + 1)^2) = (n_2, (n_2 + 1)^2) \Rightarrow \begin{cases} n_1 = n_2 \\ (n_1 + 1)^2 = (n_2 + 1)^2 \end{cases} \Rightarrow n_1 = n_2$$

Donc g est injective.

4. On va montrer que $(1,1)$ n'admet pas d'antécédent. Supposons que

$$(1,1) = (n, (n + 1)^2)$$

Alors

$$\begin{cases} 1 = n \\ 1 = (n + 1)^2 \end{cases}$$

Ce qui équivaut à

$$\begin{cases} 1 = n \\ 1 = 2^2 \end{cases}$$

Ce qui est impossible donc $(1,1)$ n'admet pas d'antécédent, g n'est pas surjective.

Allez à : Exercice 4 :

Correction exercice 5 :

$$f(n_1) = f(n_2) \Rightarrow 2n_1 = 2n_2 \Rightarrow n_1 = n_2$$

f est injective.

1 n'a pas d'antécédent car il n'existe pas d'entier naturel n tel que $1 = 2n$, f n'est pas surjective.

$g(0) = E\left(\frac{0}{2}\right) = E(0) = 0$ et $g(1) = E\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, donc $g(0) = g(1)$ ce qui entraîne que g n'est pas injective.

Pour tout $y = n \in \mathbb{N}$ (dans l'ensemble d'arrivé) il existe $x = 2n \in \mathbb{N}$ (dans l'ensemble de départ) tel que :

$$g(x) = E\left(\frac{x}{2}\right) = E\left(\frac{2n}{2}\right) = E(n) = n = y$$

g est surjective.

Si n est pair, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2p$

$$f \circ g(n) = f(g(n)) = f(g(2p)) = f\left(E\left(\frac{2p}{2}\right)\right) = f(E(p)) = f(p) = 2p = n$$

Si n est impaire, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2p + 1$

$$f \circ g(n) = f(g(n)) = f(g(2p + 1)) = f\left(E\left(\frac{2p + 1}{2}\right)\right) = f\left(E\left(p + \frac{1}{2}\right)\right) = f(p) = 2p = n - 1$$

$$f \circ g(n) = \begin{cases} n & \text{si } n \text{ est pair} \\ n-1 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Que n soit paire ou impaire

$$g \circ f(n) = g(f(n)) = g(2n) = E\left(\frac{2n}{2}\right) = E(n) = n$$

$$g \circ f = id$$

Remarque :

Comme on le voit sur cet exemple, il ne suffit pas que $g \circ f = id$ pour que g soit la bijection réciproque de f . La définition de la bijection réciproque d'une fonction $f_1: E \rightarrow E$ est :

« S'il existe une fonction $f_2: E \rightarrow E$ telle que $f_1 \circ f_2 = f_2 \circ f_1 = id_E$ alors $f_2 = f_1^{-1}$ » on a alors : f_1 et f_2 sont deux fonctions bijectives.

Allez à : Exercice 5 :

Correction exercice 6 :

$f(E) \subset E$ donc $f(f(E)) \subset f(E) \subset E$, or $f(f(E)) = E$ donc $E \subset f(E) \subset E$, par conséquent $E = f(E)$ ce qui signifie que f est surjective.

Allez à : Exercice 6 :

Correction exercice 7 :

- Supposons que g existe, $f \circ g = Id_{\mathbb{N}} \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, f(g(n)) = n \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, (g(n))^2 = n$
Si n n'est pas un carré cela ne marche pas, par exemple si $n = 2$, $(g(2))^2 = 2$ donc $g(2) = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{N}$
Il n'existe pas de fonction $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $f \circ g = Id_{\mathbb{N}}$.
- Supposons que h existe, $h \circ f = Id_{\mathbb{N}} \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, h(f(n)) = n \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, h(n^2) = n$
Les valeurs $h(p)$ prennent les valeurs qu'elles veulent sauf lorsque p est un carré auquel cas $h(p) = \sqrt{p}$, donnons une fonction h qui répond à la question :
Si $p \neq n^2$ alors $h(p) = 0$ et si $p = n^2$ alors $h(p) = \sqrt{p} = n$.

Allez à : Exercice 7 :

Correction exercice 8 :

- Si g existe alors pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $f(g(n)) = n \Leftrightarrow 2g(n) = n$, si n est impair $g(n) \notin \mathbb{Z}$ donc il n'existe pas de fonction $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ telle que $f \circ g = Id_{\mathbb{Z}}$.
- Si h existe alors pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $h(f(n)) = n \Leftrightarrow h(2n) = n$
Soit h la fonction définie, pour tout $p \in \mathbb{Z}$, par $h(2p) = p$ et $h(2p+1) = 0$ convient.

Allez à : Exercice 8 :

Correction exercice 9 :

On pose $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ et $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$, et bien sur tous les e_j sont distincts ainsi que tous les f_i .

On rappelle que le fait que f soit une application entraîne que $\{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\} \subset \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$

On suppose que f est injective, on va montrer que f est surjective.

On va montrer la contraposée, c'est-à-dire que l'on va montrer que si f n'est pas surjective alors f n'est pas injective.

Soit $f_i \in F$ et on suppose qu'il n'existe pas de $e_j \in E$ tel que $f_i = f(e_j)$ (f n'est pas surjective)

Donc $\{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\} \subset \{f_1, \dots, f_{i-1}, f_{i+1}, \dots, f_n\}$, il y a n éléments dans le premier ensemble et $n-1$ dans le second, donc il existe j_1 et j_2 , avec $j_1 \neq j_2$ dans $\{1, 2, \dots, n\}$ tels que $f(e_{j_1}) = f(e_{j_2})$, or $e_{j_1} \neq e_{j_2}$ donc f n'est pas injective.

On suppose que f est surjective et on va montrer que f est injective.

On va montrer la contraposée, c'est-à-dire que l'on va montrer que si f n'est pas injective alors f n'est pas surjective.

Si $f(e_i) = f(e_j) = u$ avec $e_i \neq e_j$ alors

$\{f(e_1), \dots, f(e_{i-1}), u, f(e_{i+1}), \dots, f(e_{j-1}), u, f(e_{j+1}), \dots, f(e_n)\} \subset \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$, le premier ensemble a $n - 1$ éléments et le second n donc il existe un f_j qui n'a pas d'antécédent, cela montre que f n'est pas surjective.

On a montré que $(i) \Leftrightarrow (ii)$, par définition $(iii) \Rightarrow (i)$ et $(iii) \Rightarrow (ii)$. Si on a (i) alors on a (ii) et (i) et (ii) entraîne (iii) de même si on a (ii) alors on a (i) et (i) et (ii) entraîne (iii) . Ce qui achève de montrer les trois équivalences.

Allez à : Exercice 9 :

Correction exercice 10 :

1. u et v sont surjectives donc $u(\mathbb{N}) = \mathbb{Z}$ et $v(\mathbb{Z}) = \mathbb{N}$ par conséquent

$$u \circ v \circ u(\mathbb{N}) = u(v(u(\mathbb{N}))) = u(v(\mathbb{Z})) = u(\mathbb{N}) = \mathbb{Z}$$

Cela montre que $u \circ v \circ u$ est surjective.

$$u \circ v \circ u(x_1) = u \circ v \circ u(x_2) \Leftrightarrow u(v(u(x_1))) = u(v(u(x_2))) \Leftrightarrow v(u(x_1)) = v(u(x_2))$$

Car u est injective

$$u \circ v \circ u(x_1) = u \circ v \circ u(x_2) \Leftrightarrow v(u(x_1)) = v(u(x_2)) \Leftrightarrow u(x_1) = u(x_2)$$

Car v est injective

$$u \circ v \circ u(x_1) = u \circ v \circ u(x_2) \Leftrightarrow u(x_1) = u(x_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Car u est injective

Finalement $u \circ v \circ u$ est injective et donc bijective (puisque'elle est surjective).

2. 7 n'admet pas d'antécédent donc f n'est pas surjective.

$$f(a, b, c) = f(a', b', c') \Leftrightarrow 2^a 3^b 5^c = 2^{a'} 3^{b'} 5^{c'}$$

L'unicité de la décomposition des entiers en produit de facteur premier entraîne que $a = a'$, $b = b'$ et $c = c'$, autrement dit f est injective.

Donc f est injective et pas surjective.

3. $\varphi(n) = 0$ et $\varphi(2n) = 0$

Donc φ n'est pas injective.

$$\varphi(\mathbb{Z}) = \{0, 1, \dots, n-1\} \subsetneq \mathbb{N}$$

Donc φ n'est pas surjective.

4. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{Z}$ on cherche s'il existe un unique couple $(u, v) \in \mathbb{Z}$ tel que

Premier cas $a \neq 0$

$$\begin{aligned}
(x, y) = f(a, b) &\Leftrightarrow (x, y) = (au + bv + 1, cu + dv - 1) \Leftrightarrow \begin{cases} x = au + bv + 1 \\ y = cu + dv - 1 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \end{matrix} \begin{cases} x - 1 = au + bv \\ y + 1 = cu + dv \end{cases} \Leftrightarrow cL_1 - aL_2 \begin{cases} x - 1 = au + bv \\ c(x - 1) - a(y + 1) = cbv - adv \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = au + bv \\ c(x - 1) - a(y + 1) = (cb - ad)v \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = au + bv \\ c(x - 1) - a(y + 1) = -v \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = au + b(-c(x - 1) + a(y + 1)) \\ v = -c(x - 1) + a(y + 1) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} au = -b(-c(x - 1) + a(y + 1)) + (x - 1) \\ v = -c(x - 1) + a(y + 1) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} au = bc(x - 1) - ab(y + 1) + (x - 1) \\ v = -c(x - 1) + a(y + 1) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} au = (bc + 1)(x - 1) - ab(y + 1) \\ v = -c(x - 1) + a(y + 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} au = ad(x - 1) - ab(y + 1) \\ v = -c(x - 1) + a(y + 1) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} u = d(x - 1) - b(y + 1) \\ v = -c(x - 1) + a(y + 1) \end{cases}
\end{aligned}$$

Si $a = 0$, alors $bc = -1$, en particulier $b \neq 0$ et $\frac{1}{b} = -c$

$$\begin{aligned}
(x, y) = f(0, b) &\Leftrightarrow (x, y) = (bv + 1, cu + dv - 1) \Leftrightarrow \begin{cases} x = bv + 1 \\ y = cu + dv - 1 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} v = \frac{x-1}{b} \\ y = cu + dv - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v = -c(x-1) \\ y = cu - dc(x-1) - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v = -c(x-1) \\ y = cu - dc(x-1) - 1 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} v = -c(x-1) \\ cu = dc(x-1) + 1 + y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v = -c(x-1) \\ u = d(x-1) + \frac{1+y}{c} \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} v = -c(x-1) \\ u = d(x-1) - b(1+y) \end{cases}
\end{aligned}$$

Ce sont les mêmes formules que dans le cas où $a \neq 0$

Donc pour tout $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ il existe un unique couple

$$(u, v) = (d(x-1) - b(y+1), -c(x-1) + a(y+1)) \in \mathbb{Z}^2$$

tel que $(x, y) = f(u, v)$, f est bijective et

$$f^{-1}(x, y) = (d(x-1) - b(y+1), -c(x-1) + a(y+1))$$

Allez à : Exercice 10 :

Correction exercice 11 :

1.

$$q_1 \geq 2 \Rightarrow 0 < \frac{1}{q_1} \leq \frac{1}{2} \quad (1)$$

$$q_2 \geq 2 \Rightarrow 0 < \frac{1}{q_2} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} \leq -\frac{1}{q_2} < 0 \quad (2)$$

En additionnant (1) et (2)

$$-\frac{1}{2} < \frac{1}{q_1} - \frac{1}{q_2} < \frac{1}{2}$$

2.

a. Pour tout $(p_1, q_1) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $(p_2, q_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$

$$f(p_1, q_1) = f(p_2, q_2) \Rightarrow p_1 + \frac{1}{q_1} = p_2 + \frac{1}{q_2} \Rightarrow \frac{1}{q_1} - \frac{1}{q_2} = p_2 - p_1$$

D'après la première question cela montre que $p_2 - p_1 \in]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$ or $p_2 - p_1 \in \mathbb{Z}$ donc $p_2 - p_1 = 0$, autrement dit $p_1 = p_2$, puis en reportant dans

$$p_1 + \frac{1}{q_1} = p_2 + \frac{1}{q_2}$$

Cela montre que $\frac{1}{q_1} = \frac{1}{q_2}$ et que $q_1 = q_2$

Finalement

$$(p_1, q_1) = (p_2, q_2)$$

Ce qui montre que f est injective.

b. Regardons si $1 \in \mathbb{Q}$ admet un antécédent, on suppose qu'il existe, on l'appelle (p, q)

$$p + \frac{1}{q} = 1$$

Ce qui équivaut à

$$\frac{1}{q} = 1 - p$$

Mais $\frac{1}{q} \notin \mathbb{Z}$ et $1 - p \in \mathbb{Z}$, ce qui est impossible. Par conséquent f n'est pas surjective.

Allez à : Exercice 11 :

Correction exercice 12 :

1. Première méthode : raisonnons par récurrence

On pose (H_n) il y a $n(n - 1)$ applications injectives de I_2 dans I_n .

Regardons si (H_2) est vraie.

Il y a 4 applications de I_2 dans I_n .

$$f_1(1) = 1 \text{ et } f_1(2) = 1$$

$$f_2(1) = 1 \text{ et } f_2(2) = 2$$

$$f_3(1) = 2 \text{ et } f_3(2) = 1$$

$$f_4(1) = 2 \text{ et } f_4(2) = 2$$

Seules f_2 et f_3 sont injectives. Il y a $2 = 2(2 - 1)$ applications injectives de I_2 dans I_2 .

Montrons que $(H_n) \Rightarrow (H_{n+1})$

Il y a $n(n - 1)$ applications injectives de $\{0,1\}$ dans $\{0,1, \dots, n\}$.

Supposons que $f(1) = n + 1$ alors $f(2) \in \{1, \dots, n\}$ (pour que $f(1) \neq f(2)$), cela fait n applications injectives de plus.

Supposons que $f(2) = n + 1$ alors $f(1) \in \{1, \dots, n\}$ (pour que $f(1) \neq f(2)$), cela fait n applications injectives de plus.

Au total, il y a $n(n - 1) + n + n = n^2 - n + n + n = n^2 + n = n(n + 1)$

L'hypothèse est vérifiée.

Conclusion pour tout $n \geq 2$, il y a $n(n - 1)$ applications injectives de I_2 dans I_n .

Deuxième méthode :

Si $f(1) = k \in \{0,1, \dots, n\}$ alors $f(2) \in \{1, \dots, k - 1, k + 1, \dots, n\}$.

Cela fait n choix possibles pour $f(1)$ et $n - 1$ pour $f(2)$, soit $n(n - 1)$ choix possibles pour $(f(1), f(2))$ de façon à ce que $f(1) \neq f(2)$ (autrement dit pour que f soit injective).

2. $f: I_m \rightarrow I_n$

f injective équivaut à $f(1) = k_1; f(2) = k_2; \dots; f(m) = k_m$, avec $k_1, k_2, \dots, k_m \in \{1, 2, \dots, n\}$ tous distincts par conséquent $m \leq n$.

Remarque :

Cela ne veut pas dire que toutes les applications de $\{1, 2, \dots, m\}$ dans $\{1, 2, \dots, n\}$ sont injectives !

Supposons que f est surjective.

Pour tout $k_1, k_2, \dots, k_n \in \{1, 2, \dots, n\}$ (les k_i tous distincts) il existe $l_1, l_2, \dots, l_n \in \{1, 2, \dots, m\}$ tels que $k_i = f(l_i)$ par définition d'une application tous les l_i sont distincts (sinon un élément aurait plusieurs images), par conséquent $n \leq m$.

Pour que f soit bijective il faut (et il suffit) que f soit injective et surjective, par conséquent il faut que $m \leq n$ et que $n \leq m$, autrement dit il faut que $m = n$.

Remarque :

Cela ne veut pas dire que toutes les applications de $\{1, 2, \dots, n\}$ dans $\{1, 2, \dots, n\}$ sont bijectives.

Allez à : Exercice 12 :

Correction exercice 13 :

1. $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2) \Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$

Car g est injective

$$g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2) \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Car f est injective.

Donc $g \circ f$ est injective.

2. Première méthode :

Pour tout $z \in G$ il existe $y \in F$ tel que $z = g(y)$ car g est surjective.

Comme pour tout $y \in F$ il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$ car f est surjective. On en déduit que pour tout $z \in G$ il existe $x \in E$ tel que $z = g(f(x)) = g \circ f(x)$ autrement dit $g \circ f$ est surjective.

Remarque :

(a) D'habitude on appelle y un élément de l'image G mais ici ce pose un petit problème de notation parce que l'on va appeler x l'élément de F et on ne saura pas trop comment appeler l'élément de E , c'est pour cela qu'il est plus malin de l'appeler z .

(b) Si on commence par écrire « pour tout $y \in F$ il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$ car f est surjective » puis « pour tout $z \in G$ il existe $y \in F$ tel que $z = g(y)$ car g est surjective » donc « pour tout $z \in G$ il existe $x \in E$ tel que $z = g(f(x)) = g \circ f(x)$ » cela ne va pas, je vous laisse réfléchir pourquoi.

Deuxième méthode :

On rappelle que $\varphi: U \rightarrow V$ est surjective si et seulement si $\varphi(U) = V$

Donc $f(E) = F$ et $g(F) = G$, par conséquent $g \circ f(E) = g(f(E)) = g(F) = G$ et on en déduit que $g \circ f$ est surjective.

3. Si g et f sont bijectives alors elles sont injectives et $g \circ f$ est injective et si g et f sont bijectives alors elles sont surjectives et $g \circ f$ est surjective, on en déduit que $g \circ f$ est bijective.

4. $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Car $g \circ f$ est injective, par conséquent f est injective.

5. Première méthode :

Pour tout $z \in G$, il existe $x \in E$ tel que $z = g \circ f(x) = g(f(x))$, donc il existe $y = f(x)$ tel que $z = g(y)$ ce qui signifie que g est surjective.

Deuxième méthode :

Comme $g \circ f$ est surjective, $g \circ f(E) = G \Leftrightarrow g(f(E)) = G$ or $f(E) \subset F$ donc

$$g(f(E)) \subset g(F)$$

Comme $g(F) \subset G$, cela donne

$$G = g(f(E)) \subset g(F) \subset G$$

D'où

$$g(f(E)) = g(F) = G \Rightarrow g(F) = G$$

Ce qui montre que g est surjective.

6.

a. $g \circ f = Id_E$ est bijective (l'identité est bijective)

$g \circ f$ est injective, d'après 4°, f est injective.

$g \circ f$ est surjective, d'après 5°, g est surjective.

Remarque :

$g \circ f = Id_E$ n'entraîne pas que $g = f^{-1}$ et que donc f et g sont bijectives.

b. $f \circ g = Id_F$ est bijective (l'identité est bijective)

$f \circ g$ est injective, d'après 4°), g est injective.

$f \circ g$ est surjective, d'après 5°), f est surjective.

c. $f \circ f = Id_E$ est bijective

$f \circ f$ est injective, d'après 4°), f est injective.

$f \circ f$ est surjective, d'après 5°), f est surjective.

Par conséquent f est bijective et $f^{-1} = f$.

Allez à : Exercice 13 :

Correction exercice 14 :

1. Pour tout $y \in Y$ il existe $x = s(y) \in X$ tel que $y = Id_Y(y) = f(s(y)) = f(x)$, f est surjective.

2. $s(y_1) = s(y_2) \Rightarrow f(s(y_1)) = f(s(y_2)) \Rightarrow y_1 = y_2$

s est injective.

3. $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow r(f(x_1)) = r(f(x_2)) \Rightarrow Id_X(x_1) = Id_X(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

f est injective.

4. Pour tout $x \in X$, pose $y = f(x)$.

Comme $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ à chaque $y \in Y$ telle que $y = f(x)$ on associe bien une unique valeur x , on définit alors $r: f(X) \rightarrow X$ par $r(y) = x$. Pour les $y \in Y$ qui ne sont pas dans l'image de X par f , autrement dit qui ne sont pas de la forme $y = f(x)$, on leur attribue n'importe quelle valeur dans X , mettons x_0 pour fixé les idées (d'ailleurs, on n'est pas obligé de leur attribuer à tous la même valeur).

Pour tout $x \in X$.

$$x = r(y) = r(f(x)) \Leftrightarrow Id_X = r \circ f$$

r est bien une rétraction de f .

Remarque :

Si $y \notin f(X)$, $r(y) = x_0$ ne sert à rien pour montrer que r est une rétraction.

5. Pour tout $x \in X$, il existe $y = f(x)$ tel que :

$$x = Id_X(x) = r(f(x)) = r(y)$$

Cela montre que r est surjective.

Remarque :

Les rôles habituels de x et y ont été inversés pour respecter les notations de l'énoncé.

6.

Si f admet une section alors f est surjective d'après 1°).

Si f admet une rétraction alors f est injective d'après 3°).

Par conséquent f est bijective, on note $f^{-1}: Y \rightarrow X$ sa bijection réciproque.

Comme $Id_X = r \circ f$, en composant par f^{-1} à droite :

$$Id_X \circ f^{-1} = (r \circ f) \circ f^{-1} \Leftrightarrow f^{-1} = r \circ (f \circ f^{-1}) = r$$

Comme $Id_Y = f \circ s$, en composant par f^{-1} à gauche :

$$f^{-1} \circ Id_Y = f^{-1} \circ (f \circ s) \Leftrightarrow f^{-1} = (f^{-1} \circ f) \circ s = s$$

D'où $r = s = f^{-1}$.

Allez à : Exercice 14 :

Correction exercice 15 :

1. $f^{-1}(\{2\}) = \{3,4\}; f^{-1}(\{1,2\}) = \{2,3,4\}; f^{-1}(\{3\}) = \emptyset$

2.

$$f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$$

$$f^{-1}([1, 2]) = [-\sqrt{2}, -1] \cup [1, \sqrt{2}]$$

Allez à : Exercice 15 :

Correction exercice 16 :

1. $[0, 1] \times [0, 1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq 1\}$

Donc

$$f([0, 1] \times [0, 1]) = \{x \in \mathbb{R}, 0 \leq x \leq 1\} = [0, 1]$$

$$f^{-1}([-1, 1]) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) \in [-1, 1]\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \in [-1, 1]\} = [-1, 1] \times \mathbb{R}$$

2.

$$f(\mathbb{N}) = \{y \in [-1, 1], y = \cos(\pi n), n \in \mathbb{N}\} = \{y \in [-1, 1], y = (-1)^n, n \in \mathbb{N}\} = \{-1, 1\}$$

$$f(2\mathbb{N}) = \{y \in [-1, 1], y = \cos(2\pi n), n \in \mathbb{N}\} = \{y \in [-1, 1], y = 1, n \in \mathbb{N}\} = \{1\}$$

$$f^{-1}(\{\pm 1\}) = \{x \in \mathbb{R}, \cos(\pi x) = \pm 1\}$$


Or $\cos(x) = 1 \Leftrightarrow x = 2k\pi$ et $\cos(x) = -1 \Leftrightarrow x = (2k + 1)\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$

$$f^{-1}(\{\pm 1\}) = \{x \in \mathbb{R}, x = 2k\pi, x = (2k + 1)\pi, k \in \mathbb{Z}\} = \{n\pi, n \in \mathbb{Z}\}$$

Allez à : Exercice 16 :

Correction exercice 17 :

1. Le point $(0, 1)$ vérifie $x \leq y$ donc $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq y\}$ est le demi-plan supérieur droit. De même $(0, 1)$ vérifie $-y \leq x$ donc $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, -y \leq x\}$ est le demi-plan supérieur droit, D est l'intersection de ces deux demi-plan, D est le quart de plan supérieur du schéma ci-dessous.



2. a.

$$L_1 \begin{cases} x_1 + y_1 = x_2 + y_2 \\ L_2 \begin{cases} x_1 - y_1 = x_2 - y_2 \end{cases} \end{cases}$$

En additionnant L_1 et L_2 on trouve que $2x_1 = 2x_2$, donc $x_1 = x_2$, puis en remplaçant dans L_1 , on trouve que $y_1 = y_2$.

b.

$$f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2) \Rightarrow (x_1^2 + y_1^2, 2x_1y_1) = (x_2^2 + y_2^2, 2x_2y_2) \Rightarrow \begin{cases} L_1 \begin{cases} x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2 \\ L_2 \begin{cases} 2x_1y_1 = 2x_2y_2 \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

$L_1 - L_2$ donne $x_1^2 + y_1^2 - 2x_1y_1 = x_2^2 + y_2^2 - 2x_2y_2$, ce qui entraîne que $(x_1 - y_1)^2 = (x_2 - y_2)^2$, comme $x - y \leq 0$ sur D , cela donne $-(x_1 - y_1) = -(x_2 - y_2)$ ou encore $x_1 - y_1 = x_2 - y_2$.

$L_1 + L_2$ donne $x_1^2 + y_1^2 + 2x_1y_1 = x_2^2 + y_2^2 + 2x_2y_2$, ce qui entraîne que $(x_1 + y_1)^2 = (x_2 + y_2)^2$,
comme $x + y \geq 0$ sur D , cela donne $x_1 + y_1 = x_2 + y_2$.

D'après 2.a. cela donne que $x_1 = x_2$ et que $y_1 = y_2$, ce qui montre que f est injective.

3. $(-1, 1) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ n'a pas d'antécédent dans D car $x^2 + y^2 > 0$.

Allez à : Exercice 17 :